

Echelle ORT en 5 items

The Opioid Risk Tool

L'échelle ORT permet une évaluation du risque de mésusage avant prescription d'un antalgique opioïde (1,2).

Mode d'emploi : les affirmations suivantes décrivent plusieurs comportements et problèmes qui peuvent apparaître lorsque l'on boit régulièrement de l'alcool. Pour chaque affirmation, vérifiez si elle vous concerne ou pas et cochez la réponse adéquate.

Questions		Femme	Homme
1. Antécédent familial d'abus d'une substance	Alcool	1	3
	Drogues illicites	2	3
	Autre	4	4
2. Antécédent personnel d'abus d'une substance	Alcool	3	3
	Drogues illicites	4	4
	Médicaments sur ordonnance	5	5
3. Age (sujet de 16 à 45 ans)		1	1
4. Antécédent de violence sexuelle pendant l'enfance		3	0
5. Trouble psychologique ou psychiatrique	Trouble de l'attention, trouble bipolaire, TOC, schizophrénie	2	2
	Dépression	1	1
Score			

Interprétation selon les auteurs :

Faire la somme des points pour les 5 questions selon le genre du patient. Si le score est compris entre 0 et 3, le risque est faible ; si le score est compris entre 4 et 7, le risque est modéré ; si le score est > 7, le risque est élevé.

Un score modéré à élevé n'est pas une contre-indication à la prescription d'un antalgique opioïde si celui-ci est indiqué dans cette douleur modérée à sévère. En revanche, une surveillance régulière à chaque consultation est recommandée avec par exemple l'échelle POMI.

Références :

1. Webster LR, Webster RM. Predicting aberrant behaviors in opioid-treated patients: preliminary validation of the Opioid Risk Tool. Pain Med Malden Mass. 2005;6(6):432-42.
2. Bonnet N, Authier N. Médicaments antalgiques opioïdes. RESPADD. Paris : RESPADD; 2018. 42 p.